

कैसे पहचानें कि बच्चे को दस्त है?



अगर आपके बच्चे को 3 या 3 से ज्यादा बार पतला मल आ रहा है।

बच्चे को दस्त से कैसे बचायें?



हर जरूरी समय पर बच्चे के हाथ साबुन से धुलवाएं, जैसे खाने से पहले, खाने के बाद और शौच के बाद।



बच्चे के पोषण पर ध्यान दें और स्तनपान कराते रहें।



दस्त का इलाज



ओआरएस दस्त के कारण हुई पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है।

ज़िंक बीमारियों से लड़ने और अंदरूनी शक्ति बढ़ाने में मदद करता है।



14 दिनों के लिए ज़िंक की गोलियां दें। रोज़ बच्चे को ज़िंक की गोलियां देने के बाद नीचे दिये गये डिब्बों पर सही का निशान लगायें।

दस्त से बचाव



खाना बनाने से पहले, बच्चों को खाना खिलाने के बाद, शौच के बाद और बच्चे का मल-मूत्र साफ करने के बाद अपने हाथों को साबुन से धोयें।



यह सुनिश्चित करें कि पीने का पानी साफ हो और एक सुरक्षित व ढके हुए कंटेनर में रखा हो।



यह सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे के आस-पास हमेशा सफाई रहे और उनके हाथ नियमित रूप से धुलवाते रहें।



हमेशा शौचालय का इस्तेमाल करें; खुले में शौच न करें। बच्चे के मल के सुरक्षित निपटान का अभ्यास करें।



सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (आईडीसीएफ)



डायरिया के संक्रमण से आपके बच्चे की सुरक्षा के लिए उपाय



सफाई और स्वच्छता

पहले छः महीने के लिए विशेष स्तनपान



स्वच्छ पीने का पानी

विटामिन ए की खुराक



लो-ऑस्मोलैरिटी ओआरएस, ज़िंक और निरंतर खान-पान

रोटावायरस से बचाव के लिए टीकाकरण



जरूरत पड़ने पर अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या आशा से संपर्क करें।



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश



डॉक्टर दस्त के सही इलाज के लिए ओआरएस और जिंक

लेने की सलाह देते हैं, जो आपके बच्चे की ऊर्जा और ताकत लौटाने में मदद करते हैं।




एक दिन में 3 या 3 से ज़्यादा बार दस्त होने को डायरिया कहते हैं। दस्त से शरीर में पानी की कमी हो जाती है।

आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ओआरएस और जिंक मुफ्त में उपलब्ध है।




दस्त का इलाज



ओआरएस के 1 पैकेट को 1 लीटर साफ पानी में घोलें।



दस्त शुरू होते ही और दस्त के प्रत्येक प्रकरण के बाद अपने बच्चे को तुरंत ओआरएस दें।



एक चम्मच पानी में या मां के दूध में जिंक की गोली मिलाकर बच्चे को दिन में एक बार, पूरे 14 दिनों तक दें।



दस्त के दौरान और बाद में बच्चे को खिलाते रहें और स्तनपान भी जारी रखें।

ओआरएस कैसे तैयार करें एवं आयु अनुरूप जिंक की खुराक



2 से 6 महीने के बीच का शिशु

जिंक + ओआरएस
10 मि. ग्रा.



14 दिनों के लिए

6 महीने से अधिक उम्र के बच्चे

जिंक + ओआरएस
20 मि. ग्रा.



14 दिनों के लिए

ज़रूरत पड़ने पर अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या आशा से संपर्क करें।